

# NATURAEQUUS

## COLIC & DIGEST

- ✓ Redução de cólicas
- ✓ Equilíbrio intestinal
- ✓ Redução de cólicas espasmódicas e melhor digestibilidade com redução de gases

“Cavalo com trato gastrointestinal sensível”



Controle de cólicas espasmódicas, distúrbios digestivos, gastrites e equilíbrio da microbiota intestinal

**Mecanismo Geral:** Regulação neuromuscular do TGI, modulação da microbiota e controle do processo fermentativo.

ATIVO	AÇÃO PRINCIPAL	AÇÃO FISIOLÓGICA
<b>Colocynthis 9 CH</b>	Cólicas intensas	Atua nos receptores muscarínicos intestinais e na regulação do SNA entérico – reduz o espasmo da musculatura lisa intestinal via modulação colinérgica. Indicado em cólicas espasmódicas com dor aguda intensa.
<b>Nux vomica 6 CH</b>	Motilidade digestiva	Atua na modulação da motilidade gastrointestinal, contribuindo para a normalização do peristaltismo e auxiliando no alívio de cólicas abdominais e distúrbios digestivos.
<b>Calcarea carbonica 12 CH</b>	Modulação do metabolismo	Regulação do metabolismo digestivo e da dinâmica abdominal associada à modulação de processos digestivos que levam à distensão abdominal, acúmulo de gases e desconforto, especialmente em situações de metabolismo digestivo menos eficiente.
<b>Lycopodium clavatum 9 CH</b>	Distensão abdominal	Modula a secreção de enzimas digestivas hepáticas e pancreáticas. Indicado em quadros de má digestão crônica com acúmulo de gases no cólon direito — região anatomicamente vulnerável no equino.
<b>Mentha piperita 4 CH</b>	Cólica abdominal	Regulação do tônus intestinal e da dinâmica de gases associada à modulação da musculatura lisa do trato gastrointestinal, contribuindo para a redução de espasmos, melhora da mobilidade de gases e alívio da distensão abdominal.

## Posologia:

**Tratamento** (episódio de cólica ou desconforto abdominal):  
10 ml a cada 20 minutos, máximo até 5 doses; se não  
houver melhora, encaminhar para atendimento  
veterinário

**Prevenção** (mudança alimentar, transporte, estresse):  
10 ml, 2 vezes ao dia, durante 3 a 5 dias



**OBS:** Dose padrão para equinos adultos com peso aproximado de 500 kg; para potros ou animais de porte menor, considerar meia dose. O medicamento a ser administrado deverá ser dosado na seringa através do bico dosador e veiculado (misturado) a uma porção de ração ou farelo. A seringa não deve fazer contato com a mucosa animal ou utensílios de uso para não ocorrer contaminação do medicamento na retirada da próxima dose.